

**60 SL**

### Descripción del producto:

ELIMINA® 60 SL es un herbicida sistémico post-emergente, hormonal, para el control de malezas de hoja ancha. Es rápidamente absorbido por el follaje, tallo y raíces.

**COMPOSICIÓN:** 600 gramos de 2,4-D ácido (ácido Dicloro-fenoxi-acético) por litro.

**MODO DE ACCIÓN:** ELIMINA® 60 SL se le incluye dentro de los herbicidas hormonales. Transportado de arriba hacia abajo (por el Simplasto), llegando de esta forma a todo los órganos de consumo y almacenamiento. Se moviliza por Xilema y Floema.

**MECANISMO DE ACCIÓN:** Interfiere en la síntesis de los ácidos nucleicos. Afectando la regulación del ADN durante la formación de ARN interrumpiendo el mensaje hacia las proteínas.

### Presentaciones:

500 ml, 1L, 3.5L, 18L y 200L

### Cultivos donde se utiliza:

Maíz, Sorgo, Maicillo,

Caña de Azúcar,

Arroz,

Papa,

Banano, Plátano,

Cítricos, Aguacate,

Palma africana, Hule,

Piña, Uva,

Potreros.

### Indicaciones generales:

**COMPATIBILIDAD y FITOTOXICIDAD:** Es compatible con plaguicidas en forma de polvos mojables y solubles en agua, preparándolos aparte y agregándolos primero al agua de aspersión, pocos minutos antes de la aplicación.

No es compatible con herbicidas emulsionables (CE) en agua. No se recomienda aplicarlo con productos de reacción alcalina o utilizar agua con pH alcalinos. No mezclar con aceites minerales.

A pesar de su selectividad a gramíneas ésta puede perderse si no se aplica en la época apropiada del cultivo afectando sus rendimientos.

Aplicado a las dosis recomendadas no presenta síntomas de fitotoxicidad en los cultivos.

### Instrucciones de manejo:

**pH ÓPTIMO DEL AGUA:** De preferencia abajo de 7, al momento de la mezcla.

**ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Cuando las malezas tengan preferiblemente una altura no mayor de 15 cm de altura o bien de 3 a 4 hojas verdaderas, que es el momento de mayor actividad de crecimiento.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** En el tanque de mezcla llene hasta la mitad de su capacidad con agua, adicione la dosis de ELIMINA® 60 SL y complete el nivel de agua recomendada.


**EQUIPO DE APLICACIÓN:** Es esencial hacer la aspersión con precisión y cubrir totalmente la maleza. Asegúrese de que las boquillas estén en buenas condiciones y que el aguilón de la aspersora esté ajustado a una altura adecuada que garantice la cobertura total.

II MODERADAMENTE PELIGROSO

Malezas	Dosis	I.A.C*	I.R**
Bledo o Hüsquilete ( <i>Amaranthus viridis</i> ) Mozote ( <i>Bidens pilosa</i> ) Yerba de pollo ( <i>Commelina diffusa</i> ) Pata de paloma o Papayita ( <i>Croton lobatus</i> ) Lechosa o Golondrina ( <i>Euphorbia hirta</i> ) Bejuco ( <i>Ipomoea triloba</i> ) Falsa Verdolaga ( <i>Kallstroemia máxima</i> ) Flor amarilla ( <i>Baltimora recta</i> ) Dormilona sensitiva ( <i>Mimosa púdica</i> ) Frijolillo o hediondilla ( <i>Cleome spinosa</i> ) Cinco negritos ( <i>Lantana cámara</i> )	<b>DOSIS GENERAL</b> 2.5 a 4 L/ha 1.75 a 2.8 L/mz <b>Arroz</b> 1.7 - 2.6 L/ha 1.2 - 2.0 L/mz  <b>Maíz</b> 1.7 - 2.3 L/ha 1.2 - 1.6 L/mz  <b>Caña de Azúcar</b> 1.7 - 2.6 L/ha 1.75 a 2.8 L/mz  <b>Pastos o Potreros</b> 1.7 - 2.6 L/ha 1.75 a 2.8 L/mz	No aplica	0 días

\*Intervalo entre la última aplicación y cosecha \*\*Intervalo de reíngreso

### Principales malezas que controla




Pata de paloma o Papayita (*Croton lobatus*)



Falsa Verdolaga (*Kallstroemia máxima*)



Flor amarilla (*Baltimora recta*)



Cinco negritos (*Lantana cámara*)

