FICHA TÉCNICA

# AMEFOR 50 SC
# HERBICIDA - TRIAZINA
# AMETRYN

**Composición Química:** **%m/v**

N2-ethyl-N4-isopropyl-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine.....50,00

Ingredientes inertes.....60,00

Contiene: 500 gramos de ingredientes activos por litro de producto comercial.

## MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

**AMEFOR 50 SC** es un herbicida sistémico y selectivo, que se absorbe principalmente por las hojas y las raíces, se trasloca acropetalmente por el xilema hasta ser acumulado en los meristemos apicales de la planta. **AMEFOR 50 SC** inhibe la fotosíntesis y otros procesos enzimáticos.

## EQUIPO DE APLICACIÓN

**AMEFOR 50 SC** puede ser aplicado con cualquier equipo de aspersión de espalda manual, eléctrica o motorizada, así también con equipo accionado por tractor. Antes de la aplicación revisar que el equipo de aspersión esté en buen funcionamiento. Calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que esté aplicando la dosis correcta. Se recomienda utilizar boquilla de abanico plano, como la TJ-8003, TJ-8004 o sus equivalentes y protector tipo campana. No aplique cuando la velocidad del viento es mayor a 8 km/h.

## FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Verificar que el pH del agua para la mezcla se encuentre en un rango de 5 - 7. Agregue al tanque de mezcla o de aspersión la mitad del volumen de agua a utilizar, luego agregue la dosis recomendada de **AMEFOR 50 SC** y agite. Complete el volumen de agua requerido y agite hasta obtener una mezcla homogénea antes de iniciar la aplicación. Después de cada aplicación lave el equipo de aspersión y protección personal.

## RECOMENDACIONES DE USO AGRONÓMICO

| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Piña<br>*Ananas comosus* | Campanilla o bejuco:*Ipomoea purpurea*<br>Siempre viva: *Commelina diffusa*<br>Golondrina: *Euphorbia hypericifolia*<br>Trébol mexicano: *Richardia scabra*<br>Tamarindillo o Flor escondida *Phyllanthus niruri*<br>Salea: *Digitaria sanguinalis*<br>Pata de gallina: *Eleusina indica*<br>Pasto estrella: *Cynodon dactylon* | 3 - 4.8 L/ha<br>(2.1 - 3.36 L/mz.)<br>**Volumen de agua:**<br>200 - 300 L de agua/ha<br>(140 - 210 L de agua/mz) | Realizar las aplicaciones post emergentes antes que la maleza alcance los 10 cms de altura. |

**INTERVALO DE APLICACIÓN**
Una o dos aplicaciones por ciclo de cultivo, a cada 8 semanas.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA**
30 días

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA**
12 horas. Si es necesario ingresar al área tratada antes que seque el producto, utilizar el equipo de protección personal recomendado para el uso de aplicación

**FITOTOXICIDAD**
No fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados. Algunas variedades de caña de azúcar pueden mostrar clorosis inicial que luego desaparece. Evite que el producto entre en contacto con cultivos aledaños por deriva o mala aplicación, ya que puede causar daños.

**COMPATIBILIDAD**
Es compatible con la mayoría de plaguicidas, sin embargo, siempre es conveniente hacer pruebas de compatibilidad antes de mezclarlo con otro producto.