KONTROL CPF 48 EC
(CHLORPYRIFOS 480 g/L, EC)

INFORMACIÓN GENERAL	
GRUPO QUÍMICO	Organofosforado
NOMBRE QUÍMICO (IUPAC)	O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate
FÓRMULCIÓN	Emulsión Concentrada
CONCENTRACIÓN	480 g de ingrediente activo por litro de producto comercial
CATEGORIA TOXICOLÓGICA	3 (PELIGRO) 

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN	
MODO DE ACCIÓN	**KONTROL CPF 48 EC**, es un insecticida no sistémico de acción por contacto estomacal y respiratorio.
MECANISMO DE ACCIÓN	Actúa sobre el sistema nervioso inhibiendo la acetilcolinesterasa, provocando acumulación de acetilcolina lo que provoca parálisis y muerte proporcionando un control efectivo para insectos minadores y chupadores.

RECOMENDACIONES DE USO	
MODO DE EMPLEO	**KONTROL CPF 48 EC** puede aplicarse con equipos manuales de tipo mochilas o bombas de espalda y tractor. Las aplicaciones deben realizarse en dirección al follaje o suelo, preferiblemente en horas de la mañana, sin mucho viento. Calibre siempre su equipo sólo con agua, antes de aplicar el producto. Asegúrese que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones. El producto debe ser utilizado en horas de la mañana, sin mucho viento y sin riesgo potencial de lluvias próximas a la aplicación. Prohibida la aspersión del producto formulado cercano a fuentes de agua.
PREPARACIÓN DE MEZCLA	Al momento de manipular el producto, preparar la mezcla y realizar la aplicación se debe utilizar el equipo de protección: guantes, botas de hule, mascarilla, sombrero, protector de ojos, pantalón, camisa de manga larga y delantal de material impermeable. Verificar que el pH del

	agua para la mezcla se encuentre en un rango de 6 – 6.5. Llene el tanque de mezcla o de aspersión a la mitad de su capacidad, luego agregue la dosis recomendada de **KONTROL CPF 48 EC** y agite. Complete el volumen de agua requerido y agite hasta obtener una mezcla homogénea antes de iniciar la aplicación. Después de cada aplicación lave el equipo de aspersión y protección personal.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Chile Pimiento ***Capsicum annuum L.*** Tomate ***Solanum lycopersicum L.***	Minador de la hoja ***Liriomyza bryoniae***	0.07 – 0.25 L/ha (0.05 – 0.17 L/mz) Volumen de agua: 200 – 400 L/ha (140 – 280 L/mz)

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA	24 horas. Si es necesario ingresar al área tratada antes que seque el producto, utilizar el equipo de protección personal recomendado para el uso de aplicación.
PERIODO DE CARENCIA	Chile pimiento: 7 días. Tomate: 7 días.
INTERVALO DE APLICACIÓN	Se recomienda un máximo de dos aplicaciones por ciclo de cultivo. Con un intervalo de aplicación de 14 días, dependiendo de la presión de la plaga.
COMPATIBILIDAD	Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso corriente, excepto los de fuerte reacción alcalina. KONTROL CPF 48 EC no debe mezclarse con productos organofosforados y carbamatos.
FITOTOXICIDAD	No es fitotóxico si se aplica en las dosis recomendadas y respetando los intervalos de aplicación.
ALMACENAMIENTO	No transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, herbicidas, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los insecticidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado. Alejado del calor, de llamas, de los niños, los animales domésticos y personas discapacitadas. Conserve el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

INFLAMABILIDAD	No inflamable.

INFORMACION DE REGISTRO

PRESENTACIONES	100, 125, 150, 250, 500 mL; 1, 3.5, 5, 10, 15, 18, 20, 50 y 100 L.

No. DE REGISTRO