PIRIFOS 48 EC

INSECTICIDA – ORGANOFOSFORADO
CHLORPYRIFOS

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO
CLORPIRIFOS *O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate*..... 48%
Ingredientes Aditivos 52%

No de Registro: EL SALVADOR
AG2021041487
Registrante:
INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA S.A

INSTRUCCIONES DE USO

PIRIFOS 48 EC Controla los insectos alterando su sistema nervioso al inhibir la acción de la enzima acetilcolinesterasa. Posee relativa residualidad superior a la de otros insecticidas organofosforados.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS
Algodón ***(Gossypium sp)***	Anthonomus grandis ***(Picudo de algodón)***, Alabama orgillacea ***(Gusano Alabama)***	2 L/ha (1.4 L/mz)
	Prodenia spp ***(gusano cortador)***, Aphis gossypii ***(Áfidos)***	1 L/ha (0.7 L/mz)
Maíz ***(Zea mays)***, Sorgo ***(Sorghum sp)***	Spodoptera frugiperda ***(Gusano cogollero),*** Mocis spp ***(Gusano medidor)***	1.0 – 2.0 L/ha (0.7 – 1.4 L/mz
Arroz ***(Oriza sativa)***	Oebalus ypsilon griseus ***(Chinche vaneadora)*** Elasmopalpus lignosellus ***(Gusano barrenador)***, Spodoptera frugiperda ***(Gusano cogollero)***	1.0 – 2.0 L/ha (0.7 – 1.4 L/mz)

INTERVALO DE APLICACIÓN: Aplicar al inicio de la plaga, no realizar mas de tres aplicaciones por cosecha.
INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 21 días para todos los cultivos.
INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Evite el reingreso de personas a un campo recién tratado con el producto y en caso de animales domésticos, hasta 7 días después de la aplicación. Si se debe entrar al área tratada antes de cumplido el plazo, se debe ingresar con el equipo de protección completo
COMPATIBILIDAD: PIRIFOS 48 EC es compatible con la mayoría de los insecticidas, herbicidas y fungicidas existentes en el mercado, pero no es compatible con productos de reacción alcalina.

EQUIPO DE APLICACION

PIRIFOS 48 EC puede utilizar equipo manual con bombas de mochila ó equipo impulsado por un tractor con un volumen de caldo de 200-400 litros de agua /ha.(140-280 lt/Mz). Utilice boquilla fina de cono. El equipo de aplicación y los utensilios utilizados en la mezcla del producto deben ser lavados después de cada jornada de trabajo por lo menos tres veces. Utilice equipo de protección adecuado: botas, guantes, máscara, sombrero, ropa de manga larga

FORMA Y PREPARACION DE LA MEZCLA

Llene el tanque de mezcla hasta ¼ de su capacidad y comience a agitar. Adicione el producto y complete el nivel del agua. Adicione el surfactante de último cuando el tanque esté casi lleno y continúe agitando. Prepare únicamente la solución que puede ser aplicada durante el mismo día. El pH adecuado es de 7.0. Una vez realizada la aplicación se debe lavar el equipo.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se siguen estrictamente las recomendaciones dadas en la etiqueta. En arroz, no se debe mezclar ni aplicar 14 días antes o después del herbicida propanil.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES

Recoja los derrames con un material absorbente (arena, tierra o aserrín); deposítelo en un recipiente y destruya los envases vacíos, busque el centro de acopio más cercano para la eliminación de envases y realice el triple lavado.

RESPONSABILIDAD CIVIL

La Compañía Fabricante y el Registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Garantizamos el contenido del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. No nos hacemos responsables por el mal uso de este producto. El fabricante no se hace responsable por el mal uso de este producto.