FICHA TÉCNICA
TEJANO 12 EC

HERBICIDA - PIRIDINA, PIRIDINA
FLUROXYPYR, AMINOPYRALID

Composición química	**%m/v**
4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid	8.00%
4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid	4.00%
Ingredientes Inertes	85.00%

Contiene: 120 gramos de ingredientes activos por litro de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN

TEJANO 12 EC es un herbicida sistémico post emergente para control selectivo de malezas de hoja ancha nocivas e invasivas, Fluroxypyr y Aminopyralid son herbicidas que poseen cualidades similares a auxinas. Es absorbido por las hojas y raíces, con translocación acropetal en la planta. Desregula los patrones de crecimiento metabólicos, afectando el proceso de crecimiento, se transloca a las regiones meristemáticas de raíces y tallos, donde ejerce su efecto.

EQUIPO DE APLICACIÓN

TEJANO 12 EC puede ser aplicado con cualquier equipo de aspersión de espalda manual, eléctrica, motorizada o tractor. Antes de la aplicación revisar que el equipo de aspersión esté en buen funcionamiento. Calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que esté aplicando la dosis correcta. Se recomienda para aplicaciones terrestres, boquillas de tipo abanico, como la TJ8003 o sus equivalentes.

FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA

1. Preparación para aplicación convencional terrestre:

a.-Verificar que el pH del agua para la mezcla se encuentre dentro de un rango 5.5-6.5.
b.-Llene el tanque de mezcla o de aspersión a la mitad de su capacidad, luego agregue la dosis recomendada de del producto y agite.
c.-Complete el volumen de agua requerido, agite hasta obtener una mezcla homogénea antes de iniciar la aplicación.

Para aplicaciones terrestres, se recomienda utilizar boquilla de abanico o sus equivalentes.

Después de la aplicación lave el equipo de aspersión y el equipo de protección personal.

FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Pasturas o Potreros	Oreganón: ***Waltheria indica*** Platanillo: ***Cleome viscosa*** Golondrina: ***Euphorbia nutans*** Tabaquillo: ***Richardia scabra*** Ixcanal: ***Acacia cornigera*** Dormilona: ***Mimosa pudica***	1.50 - 3.50 L/ha (1.05 - 2.45 L/mz) **Volumen de agua:** 300 - 400 L de agua/ha (210 - 280 L de agua/mz)	Realizar una aplicación. Un máximo de dos aplicaciones por año. La aplicación debe garantizar un mojado adecuado del follaje de la maleza

INTERVALO DE APLICACIÓN

No hay un intervalo de aplicación recomendado, dado que, si se amerita una segunda aplicación, debe realizarse cuando las malezas superen e umbral poblacional en el área productiva.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACION Y LA COSECHA

7 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA

24 horas o esperar a que el producto haya secado. Utilizar el equipo de protección personal recomendado para el uso de aplicación.

FITOTOXICIDAD

No fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados. Evite que el producto entre en contacto con cultivos aledaños por deriva o mala aplicación, ya que puede causar daños.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con otros herbicidas. Sin embargo, se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad a pequeña escala. Evitar mezclar con ácido nítrico, ácido sulfúrico, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores.